

Aus dem Pathologischen Institut der Universität Bonn.

Direktor: Professor Dr. W. Ceelen.

Über zwei
Tumoren des Glomus caroticum.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität

zu Bonn.

Vorgelegt am 6. Oktober 1936

von

Wilhelm Mahne

aus Neuß.

Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Fakultät
der Universität Bonn.

Referent: Professor Dr. W. Ceelen.



Meinen lieben Eltern.

Das Glomus caroticum fand seine erste eingehende mikroskopische Beschreibung durch L u f c h k a (1862). Er kam zu der Ansicht, daß es ein dem Hals sympathikus analoges drüsenartiges Organ sei, das aus alveolären Drüsen, Blutgefäßen und Nerven zusammengesetzt sei und somit in seinem Aufbau den sogenannten nervösen Drüsen zuzuzählen sei. Er bezeichnete es demnach als „Glandula carotica“. Gegen die Arbeit L u f c h k a s wandte sich als erster A r n o l d (1865), der auf Grund seiner Injektionspräparate dazu kam, das Glomus caroticum als einen Knäuel von Arteriengefäßen anzusehen, und der ihm daher den Namen gab: „Glomeruli arteriosi intercarotici“. Als nächster beschäftigte sich P a l t a u f eingehend mit dem Glomus caroticum. Er wies auf den Gefäßreichtum des Organs hin und auf den äußerst innigen Zusammenhang der zelligen Elemente mit der Adventitia dieser Gefäße und folgerte daraus, daß die spezifischen Organzellen den Perithelien zuzurechnen seien. Eine grundlegende Änderung erfuhren die Ansichten über das Glomus caroticum durch die sorgfältigen Untersuchungen von K o h n über die Paraganglien (1903). Das Ergebnis dieser Untersuchungen war die Zusammenfassung einer bestimmten Gruppe von Zellen, deren besonderes Merkmal die chromaffine Reaktion ist, und die von Elementen des Nervensystems, — nämlich den embryonalen Anlagen der sympathischen Ganglien, — stammen. Organe, die diese beiden Voraussetzungen erfüllen, betrachtete er als Teile eines speziellen zusammengehörigen Systems und bezeichnete sie als Paraganglien. Zu diesen sollten gehören:

- die Marksubstanz der Nebenniere,
- die Carotisdrüse (Paraganglion caroticum), und
- die Zuckermandl'ichen Körperchen.

Das Paraganglion caroticum entsteht nach K o h n aus embryonalen Bildungszellen des Sympathicus; seine Zellen geben — allerdings in sehr verschiedenem Grade — die Chromreaktion; es steht in naher Beziehung zum Sympathicus und entspricht in seinem Aufbau den übrigen Paraganglien. K o h n gibt dabei aber selbst zu, daß es beim Menschen nur sehr selten gelingt, eine ausgesprochene Chromreaktion hervorzurufen.

Die in der Folgezeit erschienenen Arbeiten befaßten sich vornehmlich mit den Möglichkeiten eines embryologischen und histologischen Zusammenhangs zwischen den Organzellen einerseits und den Nerven und Gefäßen des Organs auf der anderen Seite.

Eine neue Auffassung brachte dann erst wieder White (1935), der in ausgedehnten histologischen und embryologischen Untersuchungen am Menschen sowie an verschiedenen Säugern und Vögeln zu dem Ergebnis kam, daß das Organ nähere Beziehungen zum parasympathischen als zum sympathischen Nervensystem hat. Vor allem hebt er die Unterschiede gegenüber dem Zuckermandelförmigen Organ hervor und nimmt damit das Glomus caroticum aus der von K o h n aufgestellten Gruppe der Paraganglien heraus. Nach K o h n bestehen die Zellen des Glomus caroticum aus chromaffinen Zellen, die sich mit den anderen Paraganglienzellen gemeinsam entwickeln, und deren Ursprung auf das sympathische Nervensystem zurückzuführen sein soll. Demgegenüber weist W h i t e in seiner Arbeit darauf hin, daß das Glomus caroticum nicht allein vom Sympathicus innerviert und funktionell abhängig ist, sondern daß ein nicht zu unterschätzender Anteil seiner Nervenfasern dem parasympathischen Nervensystem angehört und vom Glossopharyngeus und Vagus stammt. Auch das zweite Kriterium K o h n s, das dieser für eine Zugehörigkeit zu den Paraganglien fordert, die positive chromaffine Reaktion, ist für das Glomus caroticum nicht beizubringen.

W h i t e untersuchte nämlich das Glomus caroticum bei zahlreichen Säugern (Ochsen und Kaninchen) und Vögeln sowie 59 menschliche Glomera carotica aus allen Lebensaltern und fand dabei, daß die chromaffine Reaktion sowohl beim Menschen wie bei Säugern und Vögeln auf Grund seiner persönlichen Untersuchungen und nach zahlreichen Berichten aus der Literatur negativ ist. Eine Tatsache, die sicherlich ihre Richtigkeit hat, wenn man bedenkt, daß selbst K o h n, der als einziger den positiven Ausfall dieser Reaktion beschreibt, zugibt: daß „es beim Menschen nur sehr selten gelingt, eine ausgesprochene Chromreaktion hervorzurufen“.

Aus der Pathologie des Glomus caroticum interessieren eigentlich in erster Linie die Geschwülste. P a u n z weist zwar in seiner Arbeit „Pathologisch-anatomische Veränderungen der Carotisdrüse“ (1923) darauf hin, daß das Organ an zahlreichen Allgemein-

erkrankungen des Körpers teilnimmt, jedoch sind diese Veränderungen, — wenigstens nach dem derzeitigen Stande der Wissenschaft, — praktisch so unbedeutend, und klinisch so wenig diagnostizierbar, daß sie auch in der speziellen Pathologie dieses Organs keine nennenswerte Rolle spielen.

Ganz anders dagegen verhält es sich mit den Geschwülsten dieses Organs. Diese haben, — vor allem in den letzten vier Jahrzehnten, — durch die Eigenart ihres Sitzes sowie durch die mit ihrer Erkennung verbundenen differential-diagnostischen Schwierigkeiten die Aufmerksamkeit der Chirurgen auf sich gelenkt. Die umstrittene zellige Zusammensetzung und Abstammung des normalen Organs und die Besonderheiten im Aufbau und der Struktur der von diesen ausgehenden Tumoren haben dazu geführt, daß eine große Anzahl dieser Geschwülste von pathologisch-anatomischer Seite eingehend beschrieben worden sind. Dietrich gibt im „Handbuch der speziellen pathologischen Anatomie und Histologie“ von Henke-Lubarsch (1926) 95 einwandfreie Fälle von hierher gehörigen Beobachtungen im Schrifttum an. Hierzu müssen noch einige neuere Fälle zugerechnet werden, die wir in den Arbeiten von Bevan und McCarthy (1929), Rankin und Welbeck (1931) und Cragg (1934) beschrieben finden. Der Grund für diese zahlreichen Veröffentlichungen ist wohl darin zu suchen, daß man trotz der mannigfachen Bearbeitungen, die die Tumoren des Glomus caroticum erfahren haben, bisher nicht zu einer Einigung über Ausgangspunkt und Charakter dieser Geschwülste gekommen ist.

Obgleich die Morphologie der beschriebenen Tumoren sehr übereinstimmend und gleichförmig ist, finden wir große Differenzen in der Nomenklatur dieser Geschwülste, je nach dem Standpunkt, den der Autor zu den spezifischen Zellen des normalen Organs einnimmt. So sprechen diejenigen, die sie von den Gefäßbildungszellen ableiten wollen, von Endotheliomen, Peritheliomen, perithelialen Haemangiomen oder auch Angiofarkomen. Andere Autoren bezeichnen sie allgemein als Hamartome, alveoläre Tumoren oder Strumen der Carotisdrüse und vermeiden es damit, sich in ihrer Auffassung über die Histogenese der Tumoren festzulegen. Herxheimer zählt sie in Anlehnung an die Lehre Kohns von den Paraganglien zu den Paragangliomen, Aschoff wählt den Namen Sympathicoblastom.

Zu diesen schwierigen Fragen Stellung zu nehmen, dürfte wohl verfrüht sein, ehe nicht über Entwicklung und Funktion des normalen Organs eindeutige Klarheit herrscht. Daher möchte ich in Anlehnung an White der für das normale Organ die unverbindliche Bezeichnung „Glomus caroticum“ vorschlägt, ganz allgemein von „Tumoren des Glomus caroticum“ sprechen.

Über diese Tumoren schreibt White ganz allgemein, daß sie mehr oder weniger unvollständig die Struktur des normalen Organs nachahmen; ferner sehe man häufig Degenerationshöfe mit Blutungen in die „Alveolen“. Um auch für unsere, weiter unten beschriebenen Tumoren einen Anhalt zum Vergleich zu haben, möchte ich vorher kurz das zusammenfassen, was in den neueren Arbeiten über den histologischen Aufbau des Glomus caroticum geschrieben wird. (White):

Von einer äußeren deutlichen Bindegewebskapsel gehen dicke bindegewebige Septen in das Organ hinein und teilen es in eine Anzahl ovaler oder runder Läppchen, die wiederum durch dünnere Septen in eine größere Anzahl kleiner „Alveolen“ unterteilt werden; letztere muß man als die eigentlichen, das Organ aufbauenden Gebilde ansehen. Kapsel und Bindegewebssepten bestehen fast ausschließlich aus lockeren, kollagenen Fasern und enthalten fast gar keine elastischen Fasern, — ein Befund, auf den übereinstimmend in der ganzen Literatur hingewiesen wird. Elastische Fasern finden sich fast ausschließlich in der Wand von Blutgefäßen. Diese Tatsache sei auch hier nochmals hervorgehoben, da sie uns bei der Betrachtung großer hyalinisierter Partien in den unten beschriebenen Tumoren Rückschlüsse erlaubt auf Vorgänge an den Gefäßen, die einer Endarteritis bzw. Endophlebitis productiva obliterans entsprechen. Im Bindegewebe der Kapsel und der Septen verlaufen Nervenfasern und zahlreiche Gefäße.

Schon bei Betrachtung mit schwacher Vergrößerung erkennt man, daß im Glomus caroticum zwei verschiedene Typen von Zellen auftreten. Der erste Zelltyp färbt sich sehr dunkel; der Kern ist etwas größer als der eines Lymphozyten und gleichmäßig intensiv dunkel gefärbt ohne eine bestimmte Chromatinstruktur in Einzelheiten erkennen zu lassen. Das Protoplasma ist im allgemeinen deutlich zu erkennen, der Zelleib rundlich bis oval; der Kern liegt häufig etwas exzentrisch. Der zweite Zelltyp besitzt einen

größeren, meist runden und bläschenförmigen Kern, der durch feine ausgesprochene Chromatinarmut auffällt. Das Protoplasma tingiert sich mit den gewöhnlichen Färbemethoden nur äußerst schwach und ist häufig überhaupt nicht zu erkennen.

Übergänge zwischen diesen beiden eindeutig bestimmbaren Zelltypen wurden nicht beobachtet. Während P a u n z (1923) sich dafür einsetzt, die ersteren dunklen Kerne für postmortale, durch Pyknose bedingte Veränderungen anzusehen, betont W h i t e unter Hinweis auf seine vergleichenden Untersuchungen an anderen Säugern und an Vögeln und mit besonderem Nachdruck, daß die beiden Zellarten zwei ganz verschiedene Typen darstellen und wahrscheinlich auch von verschiedener Herkunft und Funktion sind.

Ebenso verschieden und teilweise sogar gegensätzlich wie die Ansichten über Entwicklung und Aufbau des normalen Organs sind auch die Ergebnisse, die uns über die Funktion dieses Organs mitgeteilt werden. K o h n glaubte, daß entsprechend seiner Lehre von den Paraganglien die hierzu gehörigen Organe nicht nur morphologisch übereinstimmten, sondern auch eine funktionelle Einheit bildeten. Er sah also in seinem „Paraganglion caroticum“ ein dem Nebennierenmark analoges Organ und berichtet, daß Injektionen von Extrakten aus den Organen des chromaffinen Systems zu Blutdrucksteigerung und zu Glykofurie führen. V a s a l l e und sein Schüler M a s s i a g l i a machten dann die ersten Tierversuche über die Funktion des Glomus caroticum. Sie kamen zu dem Ergebnis, daß das Ausbrennen der Carotisdrüse oder die völlige Entfernung derselben beim Tier zu Glykofurie führt. B e t k e (1915) und F i s c h e r (1924) exstirpierten ebenfalls das Glomus und berichten über ein Zurückbleiben des Wachstums, vor allen Dingen der Knochen und über Verlust des Körpergewichts.

Während bis daher unter dem Einfluß der Arbeiten K o h n s — trotz vieler gegensätzlicher Befunde — die endokrine Natur des Glomus caroticum allgemein anerkannt war, eröffnen die Arbeiten d e C a s t r o s (1926—1928) und H e r i n g s (1923—1924) eine ganz neue Epoche in den Ansichten über die Funktion dieses Organs. d e C a s t r o ließ zunächst einmal die Glykofurie ganz außer acht, da er es für erwiesen hielt, daß dieselbe nicht durch die Exstirpation bzw. Kauterisation des Carotiskörperchens verursacht sei, sondern durch eine bei der Zerstörung desselben gesetzte Ner-

veranschädigung des Ganglion cervicale superior. Zur gleichen Zeit veröffentlichte H e r i n g seine Arbeit über die blutdruckregulierende Funktion des ganz in der Nähe liegenden Sinus caroticus. Nach seiner Ansicht beruht diese Wirkung auf einem reflektorischen Vorgang; jedoch vermag er nicht, für sein Reflex-Schema einen Rezeptor beizubringen. D r ü n e r (1925) glaubt, das Glomus caroticum, als diesen Rezeptor, und damit als ein Sinnesorgan anzusprechen zu können.

Dagegen wendet sich aber d e C a s t r o und macht eine scharfe Trennung zwischen dem Carotiskörperchen und dem Carotissinus; letzterer allein soll die anatomische Grundlage des H e r i n g'schen Reflexes darstellen. Im Glomus caroticum sieht er ein Organ, das einen entgiftenden und regulatorischen Einfluß auf die qualitative Zusammensetzung des zirkulierenden Blutes ausübt.

Diesen Gedankengängen schließt sich auch W h i t e an, der dann noch auf den günstigen zentralen Sitz des Glomus caroticum hinweist: einerseits in der Nähe des Herzens, sowie zu beiden Seiten der oberen Halsregion, wodurch es imstande ist, chemische Reize bei Veränderungen des in ihm zirkulierenden Blutes aufzufangen und dem Zentralnervensystem zu übermitteln.

Wie verhalten sich nun die Tumoren des Glomus in pathologisch-physiologischer Hinsicht? Da sie die Struktur des normalen Organs sehr ähnlich nachahmen, ergibt sich die Frage, ob sie nicht irgendwelche allgemeinen Rückwirkungen auf den Träger der Geschwulst verursachen. Dies ist nach unseren heutigen Kenntnissen nicht der Fall. Vielmehr kennen wir aus der Klinik der Carotistumoren nur rein lokale Symptome; irgendwelche Allgemeinerscheinungen sind nicht beschrieben. Auch der Blutdruck war in den Fällen, wo er vorher gemessen wurde, nicht besonders verändert.

Man muß allerdings bedenken, daß in den weitaus meisten Fällen die richtige Diagnose auf einen Tumor des Glomus caroticum vor der Operation nicht gestellt wurde. Die Folge davon ist, daß die für die Erkenntnis eventueller, durch die Hyperplasie des Organs bedingter Allgemeinsymptome notwendigen Untersuchungen nicht angestellt werden konnten. Sollte sich durch eine verbesserte klinische Diagnostik hier ein Wechsel schaffen lassen, so wäre dies wohl der Weg, auch über die Funktion des normalen Organs bedingter Allgemeinsymptome notwendigen Untersuchun-

Wegen der Seltenheit und der noch strittigen Gruppierung der Geschwülste des Glomus caroticum halten wir es für angezeigt, über zwei weitere Tumoren dieses Organs rein beschreibend zu berichten, die während der vergangenen zwei Jahre dem Pathologischen Institut der Universität Bonn zur Untersuchung zugesandt wurden.

Fall 1.

K. St., 65jähriger Mann aus Boppard, wurde am 18. November 1935 auf die chirurgische Station des St.-Marien-Hospitals in Bonn-Venusberg aufgenommen. Aus der Krankengeschichte ¹⁾ entnehmen wir folgendes:

Seit einem Jahr beobachtete der Patient eine langsam, aber stetig wachsende Geschwulst im linken Halsdreieck, die anfänglich keine besonders auffallenden Beschwerden machte. Mit zunehmendem Wachstum — besonders im letzten halben Jahre — litt er aber unter Beklemmungserscheinungen und Atemnot. Die Untersuchung ergibt an der linken Halsseite einen faustgroßen, soliden, wenig beweglichen Tumor. Die Trachea ist etwas nach rechts verdrängt. Die Stimme ist belegt. Außerdem besteht am linken Auge eine leichte Ptosis des oberen Lides, Miosis der Pupille, die auch auf Kokain kaum anspricht, sowie ein Enophthalmus: also die typische Trias des Horner-Syndroms. Diese Erscheinung ist zum ersten Male im 15. Lebensjahre des Patienten aufgefallen. Die diesem Syndrom zugrundeliegende Lähmung des Nervus sympathicus im Halsabschnitt, bedingt durch eine Läsion des Grenzstranges in diesem Abschnitt, muß also schon vor Jahrzehnten erfolgt sein. Es ist wohl als sicher anzunehmen, daß die Ursache hierzu in dem Druck der langsam wachsenden Geschwulst zu suchen ist.

Bei der am 19. 11. 1935 stattfindenden Operation findet sich dicht unter der Carotis und fest mit ihr verwachsen ein faustgroßer, harter Tumor, dessen Ursprung sehr schwer festzustellen ist. Der Tumor ist in seiner Längsrichtung mit der Carotis communis, der Vena jugularis und dem Nervus vagus fest verbacken. Während die Vena jugularis doppelt unterbunden werden muß, gelingt es, den Tumor von der Carotis und dem Nervus vagus

¹⁾ Für die freundliche Überlassung der Krankengeschichte möchte ich auch an dieser Stelle Herrn Professor Dr. Els verbindlichst danken.

frei-zu-präparieren und in toto herauszuschälen. Nach Verfor-
gung der Blutgefäße Einlegen eines Gummidrains und Hautnaht.

Der postoperative Verlauf war in den ersten zehn Tagen
kompliziert durch ein nur schwer zu beeinflussendes Glottisödem,
das zu starkem Lufthunger und zu wiederholten Erstickungsan-
fällen Veranlassung gab.

Der Patient wurde am 11. 12. 1935 aus dem Krankenhaus als
geheilt entlassen.

Der dem Pathologischen Institut zur mikroskopischen Unter-
suchung überfandte exstirpierte Tumor ist in frischem Zustand
9 cm lang, 5 cm breit und bis 4 cm dick. An ihm ergibt sich
folgender makroskopischer Befund:

Die Geschwulst hat eine äußerst scharfe, fast kapselartige Be-
grenzung, auf der zahlreiche bindegewebige Fetzen und Fetträub-
chen hängen. Ferner bemerkt man an der Außenwand des Tumors
einzelne geschlängelte größere Gefäße. Eine Aufteilung des Tu-
mors durch Bindegewebssepten, die von der Kapsel einstrahlen
(wie bei dem zweiten Tumor), ist nirgends zu bemerken. Die
Schnittfläche ist dunkelbraunrot; in der Mitte des Tumors ist ein
etwa dattelgroßer unregelmäßig begrenzter grünlich-grauer homo-
gener Bezirk von festerer derberer Konsistenz und fehenähn-
licher, hyaliner Beschaffenheit. In der dunkelbraunroten Randzone
sieht man einzelne etwa hirsekor- bis linsengroße Herde von
gelblich-bräunlicher Farbe.

Bei der mikroskopischen Untersuchung des frischen Gefrier-
präparates wird von Herrn Professor C e e l e n folgender Befund
erhoben:

Die überfandte Geschwulst vom Halsdreieck ist eine stellen-
weise äußerst zellreiche, durchaus wie ein Karzinom aussehende
Geschwulstbildung mit alveolärem Stroma, in dem vielfach ein
besonderer Reichtum an Gefäßen auffällt. Die zentralen Abschnitte
sind vollkommen hyalin degeneriert, stellenweise auch von Hae-
morrhagien durchsetzt. Etwas merkwürdig ist die relativ gute Ab-
kapselung der Geschwulst. Über den Ausgangsort läßt sich nichts
mit Sicherheit sagen. Man muß an Schilddrüse, Epithelkörperchen
und vielleicht (am wenigsten wahrscheinlich) an die Glandula caro-
tica denken.

Die in sagittaler Richtung durchschnittenene Geschwulst wird in toto in Formalin konserviert. Zur mikroskopischen Untersuchung wird eine sagittale Scheibe aus der Geschwulst herausgeschnitten und in mehrere Stücke zerlegt. Von diesen wird ein Stück auf dem Gefriermikrotom geschnitten, die übrigen werden in Paraffin eingebettet. Folgende Färbungen werden gemacht:

1. Haemalaun-Eosin.
2. Weigerts Eisenhaematoxylin. + van Giesons Pikrofuchsin.
3. Haemalaun-Sudan.
4. Rote Elastika (Weigert).
5. Mallorys Bindegewebsfärbung.
6. Retikulumfärbung nach Bielschowsky-Maresch in der Modifikation von Tibor Pap.
7. Giemsa-Färbung.

Außerdem wird die Eisenreaktion nach Stieda sowie die Reaktion auf chromaffines Gewebe nach Schmorl vorgenommen.

Schon bei schwacher Vergrößerung zeigen die Schnitte aus den Randpartien des Tumors an der Oberfläche eine deutlich ausgeprägte Kapsel; sie besteht aus ziemlich lockeren, meist parallel zur Oberfläche gerichteten, schmalen bindegewebigen Fastrzügen. In diesen Fastrzügen liegen zahlreiche, — teils weite, teils kleinere — meist venöse Blutgefäße; um sie herum findet man stellenweise rote Blutkörperchen liegen; massenhaft rote Blutkörperchen findet man aber an der Tumorkapselgrenze. An einzelnen Stellen ist der Kapsel nach außen stark von Blutkörperchen durchsetztes Fettgewebe aufgelagert, vor allem da, wo größere Gefäßstämme nach Art eines Gefäßhilus in die Kapsel einmünden. Ferner sieht man hier einzelne Nervenstämme mit marklosen Nervenfasern. Das Kapselbindegewebe ist fast überall kernarm und besitzt nur spärliche, sehr feine elastische Fasern, die entsprechend den Wänden der Kapselgefäße zu dichteren Lagen sich zusammenfinden. Zum Tumor hin sind die Bindegewebsfasern an vielen Stellen dichter zusammenlagert, verlieren ihre lockere Beschaffenheit und gewinnen hier ein homogen hyalines Aussehen. Bei der van Gieson-Färbung äußert sich dies durch einen bräunlich-roten Farbton, während die unveränderten Bindegewebsfasern sich leuchtend rot färben. Auch

färben sich diese homogen gequollenen Bindegewebsfasern an vielen Stellen mit Fettfarbstoffen bräunlichrot.

An einzelnen Stellen liegen in der Kapsel Inseln aus sehr zellreichen Tumormassen, die zentralwärts gegen die übrige Geschwulst durch eine dichte Lage von fibrösem Bindegewebe abgeschlossen erscheinen. Von anderen Stellen der Oberfläche aus strahlen gegen die im Inneren befindlichen reichlichen Tumormassen septenartige bald schmalere, bald breitere, bald dichtere, bald weiter auseinander liegende fibröse Züge aus und erzeugen mit den zwischen ihnen liegenden Tumormassen einen ziemlich gleichmäßig streifigen Charakter der Randpartien der Geschwulst. Die Fasern dieser Septen gleichen durchaus denen der Kapsel, mit welchen sie auch vielfach zusammenhängen; auch sie sehen an vielen Stellen homogen hyalin aus. Dieses tritt besonders bei den zentralen Bindegewebsmassen in den Vordergrund und äußert sich auch hier vielfach bei der Färbung nach van Gieson durch einen bräunlich roten Farbton. Das hyaline Bindegewebe ist hier so mächtig entwickelt, daß man bei schwacher Vergrößerung vielfach mehrere Gesichtsfelder nebeneinander einstellen kann, in denen nichts von Tumorzellen zu sehen ist. Während bei der H.E.-Färbung und noch ausgesprochener bei der Färbung auf elastische Fasern die hyalinen Massen fast strukturlos erscheinen, läßt sich nach van Gieson wenigstens stellenweise ein teils zirkulärer, teils längs und parallel gerichteter Faserverlauf erkennen. Nach der Peripherie zu strahlen die Massen kamm- oder fächerartig aus. Im Innern faßt das bald mehr klumpige, bald mehr faserige Gewebe zwischen sich in schmalen, schlitzförmigen oft vielfach verzweigten Spalträumen dicht beieinander liegende Tumorzellen; außerdem finden sich Hohlräume, die entweder ganz mit dichten roten Blutkörperchen und fädigem Fibrin ausgefüllt sind oder neben stark erweiterten Kapillaren Tumornester enthalten. Zuweilen liegt auch ein größeres Gefäß mit durch rote Blutkörperchen auseinandergedrängten Lagen der Adventitia in ihnen. Die Wandung solcher Gefäße ist völlig homogen hyalin geworden und geht ohne jegliche Grenze in das umgebende, ebenfalls hyaline Bindegewebe über. Bei der Färbung auf elastische Fasern sieht man hier und da in ihrer Umgebung Abschnitte einer *Elastica interna*, sowie teilweise verflochtene elastische Fasern. Andere Gefäße zeigen

ausgesprochene Intimawucherungen in den verschiedensten Stadien, angefangen von einer kleinen segmentartigen Verdickung der Intima bis zum völligen Verschuß selbst größerer Gefäße. Man sieht nämlich bei der Elasticafärbung innerhalb der zentralen hyalinen Masse zuweilen Querschnitte durch Ringe elastischer Fasern, deren Lumen völlig durch hyalines Bindegewebe ausgefüllt ist.

In das bindegewebige Gerüst der peripheren Geschwulstpartie und zwischen die hyalinen Massen des Zentrums eingebettet liegt der zellige Anteil des Tumors, der entschieden an Masse hinter dem Bindegewebe zurücktritt, denn überwiegen peripher auch bei weitem die Zellen, so beherrscht zentralwärts doch das hyaline Bindegewebe so vollkommen das Bild, daß hier die zellige Praevalenz an der Peripherie mehr als ausgeglichen wird.

Die Tumorzellen lassen sich nur stellenweise deutlich voneinander abgrenzen; meist sind die Zellgrenzen verschwommen, und die Kerne scheinen in wechselnder Dichte in großen zusammenhängenden Protoplasamassen zu liegen. Wo die einzelnen Zellen abgrenzbar nebeneinander liegen, zeigen sie eine polygonale Form; oft sind sie aber auch etwas weiter auseinandergerückt und zeigen mehr abgerundete, kugelige oder ovale Formen. Die Tumorzellmassen füllen die bindegewebigen Hohlräume zum Teil vollkommen aus, zum Teil liegen sie aber auch nur im Zentrum, wodurch zwischen ihnen und dem Bindegewebsgerüst ein leerer Spalt frei bleibt; letzteres deutet wohl mit Sicherheit auf Schrumpfungsvorgänge bei der Konservierung hin.

Das Protoplasma ist sowohl in den größeren Massen ohne Zellgrenzen als in den isolierbaren Zellen fast durchweg außerordentlich dicht feinkörnig bis völlig homogen und zeigt bei einfacher Kernfärbung einen ganz blaß bläulichen Farbton. Bei Gegenfärbungen mit Eosin oder nach van Gieson zeigt das Plasma eine starke Tinktionsfähigkeit, wobei aber wieder Nuancenunterschiede zwischen einzelnen Zellen und Zellgruppen zu beobachten sind.

Die Kerne haben sehr verschiedene Größe und Gestalt; als Grundform ist wohl eine rundliche oder kurz ovale zu bezeichnen; daneben finden sich auch länger ausgezogene Kerne und außerdem vereinzelte Riesenkerne von gänzlich verschiedenen Formen. Während die meisten Kerne sehr scharfe Konturen besitzen, die durch

eine Verdichtung des peripheren Chromatins hervorgerufen werden, und ihr Innerstes etwas blasser erscheint, in vielen Fällen auch ein feines Chromatingerüst mit undeutlichen Kernkörperchen erkennen läßt, zeichnen sich andere Kerne normaler Größe sowie die Riesenkerne durch eine sehr viel gleichmäßigere Verteilung des Chromatins und durch eine intensivere Färbbarkeit aus. — Im allgemeinen sind die Kerne in den größeren Protoplasamassen dicht beieinander gelagert, was wohl zum Teil auf Schrumpfungsvorgänge im Protoplasma zurückzuführen ist, da ja die Protoplasmassen sich häufig von der Umgebung abgehoben, also sich gleichsam kontrahiert haben. Aber auch da, wo die Zellen die Maschen des Bindegewebes ganz ausfüllen, ist eine ziemliche Dichte der Kerne zu beobachten. Nur wenn das Protoplasma zwischen ihnen lockerer und etwas verfallen erscheint, sind auch die Kerne weiter auseinandergerückt.

Wie sich die einzelnen Zellen und ihre Kerne verschieden verhalten, so zeigen auch die Zellballen und Zellhaufen sowohl in ihrer Größe und Gestalt, als namentlich in ihren Beziehungen zur Stützsubstanz große Abweichungen. Die größten zusammenhängenden Zellmassen finden sich an der Peripherie der Geschwulst, wo sie zwischen den radiären Septen meist längliche Alveolen bilden. Die Septen sind hier fast ausschließlich bindegewebig, und zwar finden sich in größeren Septen noch kollagene Fasern, die sich nach Mallory blau färben, während die kleineren Alveolenwände sich nur mittels der Gitterfärbung (Bielschowsky-Tibor Pap) darstellen lassen. Die Zellen liegen in diesen „Alveolen“, wie man aus der Stellung der Kerne schließen muß, da Zellgrenzen meist nicht erkennbar sind, meist regellos durcheinander. Da, wo sie dicht an das umgebende Bindegewebe herantreten, findet sich auch bei starker Vergrößerung ($62\times + 8\times$) kein Zusammenhang zwischen den zelligen Tumorelementen und der bindegewebigen Interzellularsubstanz; nirgends ist eine bestimmte Anordnung der Zellen in der Peripherie der Alveolen zu bemerken.

An anderen Stellen der Geschwulst komplizieren sich die Verhältnisse wesentlich dadurch, daß Kapillaren, die den bindegewebigen Septen folgen, sich von diesen abzweigen und zusammen mit spärlichen Bindegewebsfasern in die Zellhaufen eintreten und diese in mehr oder weniger deutliche Zellballen sondern. Die Ka-

pillaren besitzen stets eine kontinuierliche Endothelauskleidung und sind teils prall mit roten Blutkörperchen gefüllt, teils leer und dann entweder klaffend oder kollabiert. Nirgends finden sich in ihnen Tumorzellen. Die meist leicht gegen das Lumen vorspringenden Endothelkerne heben sich deutlich durch ihre längliche Form und stärkere Färbbarkeit von den Tumorzellen ab. Oft treten die letzteren direkt an das kapillare Endothelrohr heran, so daß sie an kernlosen Strecken daselbe unmittelbar zu begrenzen scheinen. Obwohl die Kapillaren an vielen Stellen der Geschwulst sehr zahlreich sind, kommen auch ganze Zellnester vor, die ohne jeden Zusammenhang mit solchen stehen, vielmehr nur von Bindegewebsfibrillen um- und durchzogen werden. Eigentümliche Bilder finden sich in den mitten im hyalinen Bindegewebe gelegenen Hohlräumen, die häufig sehr scharf gegen das derbe Bindegewebe abgesetzt erscheinen, wie ausgestanzt aussehen. Man findet in ihnen kleine Zellnester, die das Lumen zum Teil vollständig ausfüllen.

Nirgends findet man einen Durchbruch von Tumorzellen ins Gefäßsystem. Dagegen finden sich an vielen Stellen zwischen den Tumorzellen diffus ausgestreut mehr oder weniger veränderte rote Blutkörperchen, oft in so großer Menge, daß die Tumorzellen dagegen zurücktreten. Bisweilen drängen rote Blutkörperchen auch die Zellen von der Kapillarwand oder den bindegewebigen Zügen ab.

An einzelnen Stellen sieht man in der Umgebung solcher von Blutungen durchsetzten Partien sowie im Bindegewebe einzelne Zellen, oder auch kleine Lager von Zellen, die mit einem Pigment beladen sind, das eine deutliche Eisenreaktion gibt.

Während diese beschriebenen Bilder sich in den fünf jetzt untersuchten Tumorstücken mit ziemlicher Gleichmäßigkeit wiederholen, bietet merkwürdigerweise das seiner Zeit frisch untersuchte Stück einen etwas anderen Befund. Auch hier finden wir eine sehr gefäß- und zellreiche Geschwulst und vor allem fielen auch in diesem Stück die umfangreichen, hyalin degenerierten zentralen Abschnitte auf. Jedoch finden sich hier zahlreiche Tumorzellen von einer ausgesprochen hoch-zylindrischen Form, die stark an ein Karzinom erinnern mit alveolär angeordnetem Stroma.

Jedoch fiel damals schon die gute Abkapselung der Geschwulst auf, die nicht recht zu dem Bild eines Karzinoms paßte.

Fall II.

Der zweite Tumor stammt von einer 40jährigen Frau, die im Krankenhaus zu Remscheid-Lennep (Chefarzt Dr. Everts) operiert wurde. Die Geschwulst, die an der linken Halsseite saß, bestand nach Aussage der Kranken sechs Jahre und ist verschiedentlich als „Schönheitsfleck“ oder als „Drüzenschwellung“ mit Einreiben und Aufschlägen behandelt worden. Röntgenbestrahlte wurde nicht. Bei der Operation fand sich ein in der Carotidengabelung sitzender, mit den Carotisästen fest verwachsener Tumor, der seine arterielle Blutversorgung aus der Arteria carotis externa bezog. Die exstirpierte Geschwulst wurde dann dem hiesigen Pathologischen Institut unter der Diagnose „Tumor des Nodulus caroticus“ überfandt. Bei der sofort vorgenommenen mikroskopischen Untersuchung wurde von Herrn Professor C e e l e n folgender Befund erhoben:

Der überfandte Tumor zeigt eine in Zügen wachsende Geschwulst, deren Zellen teilweise aus matter gefärbten epithelähnlichen Elementen besteht, teilweise aus intensiver färbbaren, dicht zusammenliegenden, oval- und schmalkernigen Elementen. Das Stroma ist stellenweise zart alveolar angeordnet, an anderen Stellen hyalin verdickt und weist zahlreiche Blutgefäße auf. Es könnte sich um eine Geschwulstbildung der Carotisdrüse handeln.

Von dem Tumor wird etwa ein Viertel in Form eines längs herausgeschnittenen Teiles aufgehoben und in 10%igem Formalin fixiert. Dieser Teil wird jetzt — etwa zwei Jahre später — erneut untersucht. Das konservierte Präparat ist noch wesentlich geschrumpft. Es ist etwa 4,5 cm lang und bis zu 2,5 cm breit. Auch hat der Tumor vollständig seine natürlichen Farben eingebüßt: seine Konsistenz ist mäßig derb. Die Geschwulst besteht aus zwei Lappen, die in topographischer Hinsicht ähnlich angeordnet sind, wie die Lappen der linken Lunge. Außen findet sich eine derbe Kapsel, die mit einigen Septen in den Tumor hineinragt. Der Außenwand liegen einzelne größere Gefäße auf. Die Schnittfläche ist überall gleichmäßig grauweiß und zeigt einzelne kleine, deutlich durch ihre rotbraune Farbe auffallende Fleckchen (Blutungsherde?).

Das Präparat wird in mehrere Stück zerlegt, von diesen wird eins mit dem Gefriermikrotom geschnitten, die übrigen werden in Paraffin eingebettet. Folgende Färbungen werden angewandt:

1. Haemalaun-Eosin.
2. Weigerts Eisenhaematoxylin + van Giesons Pikrofuchsin.
3. Haemalaun-Sudan.
4. Rote Elastika (Weigert).
5. Mallorys Bindegewebsfärbung.
6. Retikulumfärbung nach Bielschowsky-Marechal in der Modifikation von Tibor Pap.
7. Giemsa-Färbung.

Außerdem wird die Eisenreaktion nach Stieda sowie die Reaktion auf chromaffines Gewebe nach Schmorr vorgenommen.

Bei schwacher Vergrößerung lassen die Schnitte überall an der Oberfläche der Geschwulst eine fibröse Kapsel erkennen. Diese ist oft sehr dünn und besteht nur aus einer schmalen Lage dicht beieinanderliegender, parallel zur Oberfläche oder leicht gewellt verlaufender Fibrillen mit wenigen zwischengelagerten Kernen. An anderen Stellen verbreitert sie sich, wobei die Fasern gröber werden, und zuweilen zu homogen hyalinen Bändern verschmelzen. Von solchen Stellen aus dringen ziemlich breite Fortsätze der Kapsel ins Innere vor, um dort nach kürzerem oder längerem, meist radiär gerichtetem Verlauf, wulst- oder knopfförmig zu enden. Durch diese bindegewebige Septen wird eine grobe Lapung der oberflächlichen Geschwulstpartien bedingt.

Der Kapsel aufgelagert sieht man stellenweise lockeres Bindegewebe, oft von roten Blutkörperchen durchsetzt, in das ziemlich zahlreiche venöse und arterielle Gefäße sowie größere Nervenstämme eingelagert sind. Diese treten vielfach auch in die Kapsel selbst ein oder durchziehen sie und dringen, umgeben von Bindegewebe ins Innere der Geschwulst vor. An manchen von ihnen sind ausgesprochene endarteriitische bzw. endophlebitische Veränderungen zu konstatieren: entweder gleichmäßige Verdickung der ganzen inneren Gefäßwand oder wulstförmige Vorbuckelungen derselben an einer Stelle der Circumferenz; stets sind die Intimawucherungen ziemlich zellreich und nur von ganz zarten elastischen Elementen durchzogen. In anderen Gefäßen finden sich zusammen-

geklumpfte, sedimentierte Blutkörperchen, die zum Teil schon im Zerfall begriffen sind, und zwischen denen man reichlich braunes, körniges, dem Haemosiderin ähnliches Pigment findet. Auch innerhalb des Tumors findet man dieses Pigment — zum Teil sogar sehr reichlich — in der Nähe von Gefäßen und innerhalb größerer Blutungen. Außerdem finden sich um einzelne kleinere Kapselgefäße geringe Ansammlungen von einkernigen Rundzellen.

Die Kapsel selbst besitzt nur außerordentlich feine elastische Fasern, die zwischen den Bindegewebsfibrillen liegen oder diese umspinnen; nur um die Gefäße herum sind die Fasern stärker und dichter.

Die Geschwulst selbst erweist sich bei Betrachtung der Schnitte mit schwacher Vergrößerung als sehr bindegewebsarm; da, wo das Bindegewebe im Innern der Geschwulst in Begleitung größerer Gefäße oder in Form von größeren Trabekeln anzutreffen ist, verhält es sich ganz analog dem der Kapsel. Auch an den größeren Gefäßen im Innern der Geschwulst treffen wir die gleichen Veränderungen an, die wir für die Kapselgefäße beschrieben haben.

An spezifischen Zellelementen des Tumors müssen wir zwei verschiedene Zellformen unterscheiden:

- a) runde, ovale oder meist polyedrische Zellen mit einem großen, runden bis kurz-ovalen, blassen und chromatinarmen Kerne; sowohl Protoplasma wie auch Kerne färben sich nur sehr schwach.
- b) wesentlich kleinere rundliche Zellen mit runden oder ovalen Kernen; Protoplasma wie auch die Kerne zeichnen sich hier durch ihre starke Tinktionsfähigkeit aus; die Kerne färben sich wie bei Lymphozyten gleichmäßig tiefdunkel, ohne einzelne Chromatinteilchen besonders hervortreten zu lassen. Ihre Größe entspricht etwa der von Plasmazellen.

Wir finden also hier jene zwei Zellformen wieder, die den Zelltypen entsprechen, die White im normalen Glomus caroticum beschreibt.

Was nun die Anordnung dieser spezifischen Zellelemente im Tumor betrifft, so finden wir einerseits Partien, in denen jede der beiden Zellformen streng gefondert in Zellballen oder Zellnestern zusammen liegen, die durch kapillarreiche Bindegewebssepten von-

einander getrennt werden und dadurch einen alveolenartigen Aufbau bekommen.

Daneben gibt es aber auch in allen Abschnitten des Tumors große Flächen der Schnitte, die bei schwacher Vergrößerung überhaupt kein fibröses Zwischengewebe erkennen lassen, sondern einen rein zelligen Charakter zu besitzen scheinen. Hier finden wir beide Zellformen wahllos mit noch anderen Zellelementen durcheinander liegend.

An solchen Stellen erkennt man mit schwacher Vergrößerung nicht die geringste Anordnung, die Kerne liegen anscheinend vollständig regellos durcheinander, nur ihre verschiedene Größe, Form und Färbungsintensität läßt vermuten, daß diese Partien nicht aus gleichartigen Elementen zusammengesetzt sind.

Bei Betrachtung mit starken Vergrößerungen erkennt man, daß diese Partien des Tumors äußerst reich an Kapillaren erscheinen, die dadurch, daß sie meist mehr oder weniger kollabiert sind, und einen stark geschlängelten Verlauf nehmen, und durch die enge Anlagerung verschiedenartiger zelliger Elemente bei schwacher Vergrößerung als solche nicht zu erkennen sind. Diese Kapillaren stellen entweder nackte Endothelrohre dar oder sie werden umhüllt von äußerst feinen Bindegewebsfasern, denen spindelige Zellen sowie Zellen mit kleinen, ovalen, stark tingierten Kernen und dunklem Protoplasma beigelegt sind. Bisweilen bilden diese zelligen Elemente auch ganze Zellager zwischen Kapillarverzweigungen, so daß die eigentlichen Tumorzellen dagegen zurücktreten. Man findet dann dicht zusammengelagert lang ausgezogene spindelige Zellen mit dunklen Kernen, die Fibroblasten gleichen, und jene letzterwähnten kleineren ovalen Zellen mit dunklem Kern sowie vereinzelte, große, blaße Tumorzellen mit chromatinarmen, bläschenförmigen Kernen, die die in allem den schon oben unter a) beschriebenen Tumorzellen entsprechen. Die Tumorzellen selbst liegen hier anscheinend diffus verstreut, ohne eine bestimmte Anordnung erkennen zu lassen. Manchmal bilden sie kleine „Zellballen“, oft nur aus wenigen Zellen bestehend, die von feinen Bindegewebsfasern oder einer Kapillarschlinge umspannen werden. Die Kerne sind hier bald deutlich ausgesprochen bläschenförmig, rund oder oval, bald gleichmäßig dunkel tingiert und von ganz unregelmäßig eckig-höckriger Form, und ihre Größe

schwankt zwischen der von roten Blutkörperchen und der von großen Monozyten. Wo dagegen die Tumorzellen zu kleinen Ballen zusammengefloffen sind, herrscht die rundliche, ovale oder polyedrische Zellform vor und der Zelleib zeigt hier ein volles, leicht gekörntes Protoplasma. Auch haben die Kerne mehr gleichmäßig rundliche oder kurzovale Gestalt, und zeigen nicht solche Differenzen in ihrer Größe. Vereinzelt trifft man hier auch Riefenzellen an mit großen dunklen Kernen, die den Umfang der übrigen um das Doppelte überfchreiten.

Andere Stellen, in denen wir die oben unter a) angeführten großen, blassen Tumorzellen finden, haben deutlich alveolären Bau, ohne daß auch hier gröbere Bindegewebsfasern zu fehen sind. Die meist sehr dünnen Septen zwischen den teils rundlichen, teils länglich-ovalen Alveolen scheinen vielmehr rein kapillarer Natur zu fein, was namentlich da hervortritt, wo der zellige Alveolarinhalt sich von den Septen zurückgezogen hat. Solche alveolar gebauten Partien finden sich in der Geschwulst, sowohl direkt subkapfulär, als auch im Zentrum der Geschwulst; sie sind meist nicht scharf gegen die Umgebung abgesetzt, sondern verlieren sich durch allmähliches Undeutlicherwerden der Alveolarsepten in die vorher beschriebenen, anscheinend ungeordneten Zellmassen. — Wo die alveolär angeordneten Tumorzellen zwischen den von den Gefäßdurchschnitten ausstrahlenden, derberen Bindegewebszügen liegen, haben die Alveolen ganz verschiedene Form und Größe, bedingt durch den Verlauf der Bindegewebsfasern.

Bei der Betrachtung mit starken Objektiven bieten diese rein alveolären Partien verhältnismäßig einfache Bilder dar. Meist füllen die Tumorzellen den ganzen Raum zwischen den Septen aus; zuweilen findet sich auch zwischen dem Alveolarinhalt und den Septen ein wohl sicher arteficieller leerer Raum. Die Kerne der Zellen haben wechselnde Größe und Form; die weitaus meisten Kerne sind rund oder etwas länglich oval und zeichnen sich durch eine scharf begrenzte, dunkle Peripherie aus, die einen helleren, von zahlreichen kleinen, kugeligen oder unregelmäßig gestalteten Chromatinteilchen durchsetzten Kerninhalt umschließt; daraus ergeben sich Kernbilder von bläschenförmigem Charakter. Dazwischen kommen Kerne vor, die gleichmäßig dunkel tingiert sind. Einzelne Riefenkerne zeigen teils Bläschenform, teils sind sie

chromatinreich und haben unregelmäßig zackige Gestalt. Große und kleine, runde und ovale, glattrandige und höckerige Kerne liegen völlig regellos durcheinander, bald dicht beifammen, bald weit auseinander gerückt, eingebettet in Protoplasamassen, die häufig keine Zellgrenzen bemerken lassen. Sind aber Zellkonturen vorhanden, so erkennt man einen ungemeinen Reichtum an Zellformen. Runde, ovale und polyedrische, überhaupt mehr regelmäßige Formen sind selten, dagegen finden sich Zellen mit Ausläufern aller Art, mit großen circumscripten vakuolenartigen Bildungen oder mit lang ausgezogenem spindelförmigem Leib überall in großer Anzahl. Die Zellen scheinen nur stellenweise sich gegenseitig mit breiteren Flächen zu berühren, meist stehen sie wohl durch Ausläufer miteinander in Zusammenhang oder sie sind ganz voneinander isoliert. Das Protoplasma ist entweder ganz fein vakuolär oder körnig, nirgends aber völlig homogen. Zerfallene Massen liegen auch zwischen den Zellen und in den von Zellausläufern umschlossenen Hohlräumen. Überall gewinnt man dadurch den Eindruck, daß sich das Protoplasma nur schlecht hat konservieren lassen. Verstärkt wird dieser Eindruck noch dadurch, daß weder durch basische, noch durch saure Farbstoffe eine Plasmaintinktion gelingt, so daß das Protoplasma bei jeder Färbung blaß und im Zerfall begriffen erscheint. —

Die Septen zwischen den Alveolen bestehen oft nur aus einem nackten kapillaren Endothelrohr, an das die periphersten Zellen des Alveolarinhaltes direkt herantreten, ohne dabei irgendeine bestimmte Anordnung erkennen zu lassen. Häufiger als kapillare Septen sind solche, bei denen sich außen an das Endothelrohr äußerst feine Bindegewebsfibrillen — die sich vor allem mittels einer Mallory-Färbung sehr deutlich darstellen lassen, — anlagern, zwischen denen sich langgestreckte, spindelige Zellen nachweisen lassen. Die Kapillaren sind in der Regel ganz oder fast ganz kollabiert, nur selten trifft man in ihnen rote Blutkörperchen. Sie bilden zwischen den Alveolen ein ziemlich regelmäßiges Maschenwerk und anastomosieren vielfach miteinander. Wo sich mehrere kreuzen oder vereinigen, finden sich stets reichlichere zarte Bindegewebsfasern und spindelige oder ovale Zellen ihrer Außenwand angelagert. — Blutaustritte aus den Kapillaren scheinen hier selten zu sein; nur vereinzelt kommen Alveolen vor, in denen zwischen

den Tumorzellen freie rote Blutkörperchen liegen. Auf vorausgegangene Blutungen deutet auch der stellenweise Befund von Zellen hin, die mit bräunlichem scholligem Pigment beladen sind und die teils vereinzelt, meist aber in kleineren Gruppen in der Nähe von Blutgefäßen im Bindegewebe liegen.

Verhältnismäßig einfach ist auch der Aufbau jener Partien, in denen wir die unter b) erwähnten Tumorzellen in dichten Nestern und Zellballen zusammengelagert finden, und die bei schwacher Vergrößerung keinen eigentlich alveolären Bau, vielmehr ein diffuses Gefüge äußerst dicht liegender Tumorzellen aufweisen. Hier liegen die Tumorzellen alle äußerst dicht beisammen, nirgends findet sich zwischen den Tumoren oder zwischen Tumorzellen und Bindegewebssepten ein leerer Raum oder eine Vakuolenbildung. Durch die dichte Zusammenlagerung sind meist keine Zellgrenzen zu erkennen. Sind aber Zellkonturen vorhanden, so sind die Zellen meist rundlich bis kurz-oval. Bildungen von Ausläufern und Protoplasmafortsätze sind hier nirgends zu erkennen. Das Protoplasma ist gleichmäßig feinkörnig und färbt sich mit sauren wie basischen Farbstoffen ziemlich intensiv, in den mit Haemalaun-Sudan gefärbten Präparaten hat es einen deutlich bräunlichen Farbton. Zelleinschlüsse oder Vakuolenbildungen im Zelleib wurden nirgends gefunden.

Die Kerne liegen außerordentlich dicht, nicht selten berühren sie sich sogar. Ihre Größe wechselt zwischen engen Grenzen und entspricht, — wie bereits oben erwähnt — etwa der von Plasmazellen. Die Form ist ziemlich konstant, rund bis kurz-oval, manchmal etwas dreieckig, selten mit einseitiger leichter Impression, so daß eine Nierenform entsteht; sie scheint sich im allgemeinen den Raumverhältnissen anzupassen. Kernteilungsfiguren konnte ich hier nirgends beobachten.

Da, wo keine Zellgrenzen sichtbar sind, kann man nur aus der Dichte der Kerne auf die Größe und aus der Richtung ihrer Längsachse auf die Lage der Zellen zueinander schließen. So ergibt sich, daß auch hier von einer bestimmten Anordnung der Zellen innerhalb der „Zellnester“ keine Rede ist; es finden sich wohl hin und wieder Züge und Gruppen von Zellen mit gleich gerichteter Kernachse, doch gewinnt man dabei stets den Eindruck, daß es sich hierbei um ein Anpassen an die räumlichen Verhältnisse und nicht

um eine durch die Natur der Zellen und ihrer Wachstumsrichtung bedingte Anordnung der Zellen handelt.

Die Bindegewebssepten zwischen diesen „Zellballen“ sind ziemlich breit, meist sogar ebenso breit wie die Zellstränge. In ihnen finden wir zahlreiche Fibroblasten und Fibrozyten mit feinen und gröberen, zum Teil sogar schon hyalin entarteten Bindegewebsfasern. An einzelnen Stellen sind sogar schon ganze Bindegewebsbündel hyalinisiert.

Zwischen den Bindegewebsfasern liegen reichlich, prall mit Blut gefüllte Gefäße sowie massenhaft aus den Gefäßen ausgetretene rote Blutkörperchen. Stellenweise Anhäufungen von bräunlichem, amorphem, haemosiderinähnlichem Pigment lassen den Rückschluß zu, daß es auch schon intra vitam zu Blutaustritten gekommen ist, und daß es sich dabei nicht um eine bei der Operation oder noch später gesetzte artefizielle Schädigung handeln kann.

Zwischen den Bindegewebszügen und den Tumorzellhaufen liegen dann vielerorts dünne, meist kollabierte Kapillaren. Wenn sich auch die Tumorzellen direkt an die Kapillaren anlagern, so läßt sich nirgends eine bestimmte, gesetzmäßige Anordnung der dem Septum zunächst liegenden Tumorzellen feststellen. Da man infolge des Mangels deutlicher Zellgrenzen nur aus der Achsenstellung der Kerne auf die der ganzen Zelle schließen kann, so wird die Entscheidung, wie sich die Zellen auf den Septen oder den Kapillaren aufpflanzen, erschwert; doch läßt sich aus dem bunten Durcheinander der Kernachsenstellung mit Sicherheit entnehmen, daß irgendeine Regel, etwa eine pallisadenartige Anordnung, in der Lage der Zellen zu Bindegewebe oder Kapillaren nicht vorhanden ist. Die Zellen treten vielmehr mit bald quer, bald längs, bald schräg zum Septum gestellter Längsachse an die Septen heran.

Ein Einbruch von Tumorzellen in Gefäßlumen ist nirgends zu beobachten.

Schließlich sei noch darauf aufmerksam gemacht, daß die erwähnten Pigmentzellen eine schwache Blaufärbung bei Vornahme der Stieda'schen Eisenreaktion zeigen.

Die zuerst beschriebene Geschwulst (Fall I) gleicht in allen wesentlichen Punkten den bisher veröffentlichten Neubildungen des Glomus caroticum, während wir in Fall II zwar auch die in

allen anderen Arbeiten als typisch hingestellten Zellformen antreffen, jedoch in der Anordnung derselben einige Besonderheiten verzeichnen müssen. Der Mehrzahl der anderen Fälle reihen sich unsere Tumoren auch klinisch an.

Aus einer statistischen Mitteilung kann man entnehmen, daß die Geschwulst häufiger linksseitig als rechts auftritt, — eine Tatsache, die auch in unseren beiden Fällen zutreffend ist. Gewiß kann es sich hier um einen rein zufälligen Befund handeln; da jedoch die Bevorzugung der linken Halsseite bei vielen Autoren hervorgehoben wird, möchten wir auch auf diese Eigentümlichkeit hinweisen. Dabei möchte ich mir allerdings nicht die Ansicht v. He in l e t h s zu eigen machen, der in den Tumoren des Glomus caroticum eine geschwulstmäßige Hyperplasie erblickt, für die ein mechanischer oder entzündlicher Reiz eine gelegentliche Ursache bilden soll. Als solche macht er die anatomischen Verhältnisse der Arteria Carotis sinistra verantwortlich und begründet damit gleichzeitig die Linksprävalenz. Während normalerweise die Arterie des Glomus in schräger Abgangsrichtung aus der Bifurkation der Carotis abgeht, soll in anderen Fällen dieser Ast senkrecht aus der Bifurkation entspringen. Dadurch setzt sich nach v. He in l e t h der Druck der Blutfäule der Carotis communis „ungeschwächt und direkt, weil in gleicher Richtung auf das Drüsengefäß und auf die Drüse selbst fort“ und gibt damit Anlaß zu einer geschwulstmäßigen Hyperplasie des Organs. Diese Ansicht hat sich aber bei keinem der beschriebenen Fälle bestätigt gefunden und entspricht auch in keiner Weise unserem heutigen Wissen von der kausalen Geschwulstgenese. Somit entfällt sie auch als gültige Erklärung der bevorzugten Lokalisation auf der linken Halsseite, die wir eben — wie gesagt — nur als merkwürdig hervorheben können.

Die Patienten standen im Alter von 65 und 40 Jahren und bemerkten seit einem bzw. sechs Jahren die Entwicklung einer allmählich größer werdenden und nur in der letzten Zeit vor der Operation angeblich schneller wachsenden Geschwulst an der linken Seite ihres Halses. Die klinischen Erscheinungen bestanden im Fall I in Beklemmungserscheinungen und Atemnot, hervorgerufen durch eine Verdrängung der Trachea. Ein auffallendes Symptom, das ich sonst nirgends in der Kasuistik der Carotistumoren gefunden habe, ist in diesem Falle das Bestehen des Horner'schen Syndroms, das

bei dem jetzt 65jährigen Patienten zum ersten Male im Alter von 15 Jahren beobachtet worden war. Es muß also als wahrscheinlich angesehen werden, daß die Geschwulst in einem geringeren Umfange damals schon bestanden hat, dann aber lange in dem bestehenden Zustande verharrte, um erst im letzten Jahre vor der Operation wieder stärkere Wachstumstendenzen zu zeigen. Die Ursache für das Horner-Syndrom liegt in einer Lähmung des Nervus sympathicus im Halsabschnitt, bedingt durch eine Läsion des Grenzstranges in diesem Abschnitt. Der Grund einer solchen Läsion dürfte hier wohl in dem Druck der langsam wachsenden Geschwulst zu suchen sein.

Im Fall II werden keine subjektiven Beschwerden angegeben, vielmehr waren es kosmetische Gründe und wohl eine gewisse Krebsangst, die die Frau zur Operation veranlaßten. In beiden Fällen war die Haut über der Geschwulst gut verschieblich, dagegen die Geschwulst selbst von der Unterfläche nicht abzuheben.

Bei der Operation fand sich jedesmal der Tumor in der Gabelung der Carotis sitzend und fest mit den Ästen derselben verwachsen; im Fall I waren auch die Vena jugularis und der Nervus vagus vom Tumor umklammert und mit ihm verbacken.

Makroskopisch entspricht der erste Tumor durchaus vielen von anderer Seite als Tumor des Glomus caroticum beschriebenen Geschwülsten, vor allem auch in seiner braunroten Farbe, die von vornherein auf einen starken Blutreichtum schließen ließ. Den zweiten Tumor habe ich leider nicht frisch gesehen, sondern erst, nachdem er fast anderthalb Jahre in Formalin gelegen und dadurch seine natürlichen Farben verloren hatte.

Die mikroskopische Untersuchung ergab für den Tumor I eine auffallend starke Ähnlichkeit mit den Abbildungen, die wir in der Literatur über die Carotistumoren finden; aber nicht nur damit, sondern wir finden in ihm auch die Übereinstimmung mit den Zellstrukturen und ihrer Anordnung, die uns White vom normalen Glomus caroticum gibt. So finden wir in einer nach unseren heutigen Erkenntnissen regellosen Anordnung innerhalb der Alveolen die beiden auch im normalen Organ regelmäßig vorkommenden Zelltypen:

- a) nur schwer voneinander abzugrenzende Zellen mit feinkörnigem und sehr blassem Protoplasma; ihre bläschenförmigen

gen, rundlichen Kerne zeigen eine ringförmige Chromatinansammlung an der Kernperipherie, von der aus ein mehr oder weniger ausgeprochenes Chromatingerüst mit mehreren Nucleolen in das blaß homogene Kerninnere hineinragt.

- b) Rundliche bis ovale Zellen mit stärker färbbarem Protoplasma und runden bis kurz-ovalen, gleichmäßig dunklen Kernen, die keinerlei Chromatingerüst erkennen lassen.

Nicht ganz so klar liegen dagegen die Verhältnisse bei dem zweiten Tumor. Wir finden hier nicht die beschriebene Zusammenlagerung beider Zellformen innerhalb rundlicher oder länglicher Alveolen; vielmehr sehen wir hier sich deutlich unterscheidende Bezirke, in denen innerhalb von Alveolen, die durch gefäßreiche Septen voneinander getrennt sind, immer eine der beiden Zellformen anzutreffen ist. Daneben gibt es aber dann noch Partien, in denen beide Zellformen mit noch anderen Zellelementen regellos zusammen liegen. Diese Partien besitzen jedoch rein zelligen Charakter und lassen keinerlei ordnendes Zwischengewebe erkennen. Trotz dieses etwas anders gearteten Aufbaues und der in vielen Partien des Tumors auffallenden scharfen Trennung beider Zellformen, erkennen wir auch hier einwandfrei die typischen Zellelemente wieder, die für das normale Organ charakteristisch sind, und die wir auch in dem Tumor I gefunden haben.

Ein weiteres Merkmal, das unsere beiden Tumoren miteinander und mit den übrigen beschriebenen Fällen sowie vor allem auch mit dem normalen Glomus caroticum gemeinsam haben, ist der große Gefäßreichtum. In den Bindegewebssepten sowie vielfach auch innerhalb der Zellballen liegen zahlreiche Kapillaren, die oft nichts anderes darstellen als ein einfaches Endothelrohr; oft treten sie sogar so nahe an die Wand der Zellhaufen heran, daß man nur aus dem Vorhandensein von Endothelkernen auf eine eigene Wand der Bluträume schließen kann. — Trotz der nahen örtlichen Beziehungen zwischen Kapillaren und Tumorzellen ist in keinem der beiden Tumoren eine gesetzmäßige Anordnung der Zellen um die Kapillaren herum zu bemerken, die sich in einer einheitlichen Achsenstellung der Zellen äußern würde. Die Zellen treten vielmehr anscheinend regellos an die Kapillarwandungen heran, und man hat den Eindruck, daß sie sich in ihrer Lagerung zueinander den räum-

lichen Verhältnissen anpassen und nicht bei ihrem Wachstum einer aus inneren Ursachen bedingten Richtung folgen.

In der Differentialdiagnose sind die Geschwülste des Glomus caroticum gegen folgende Neubildungen abzugrenzen (K a u f m a n n):

1. Branchiogenes Karzinom.
2. Sekundärer Lymphdrüsenkrebs bei Kehlkopf- oder Oesophaguskarzinom.
3. Von versprengtem Schilddrüsenkeim ausgehende Geschwulst.
4. Tiefes Halsfibrom.
5. Parathyreoidales Polykystom.
6. Cystisches Embryom.

Nach Erwägung dieser differentialdiagnostischen Möglichkeiten und bei Heranziehung des bestehenden klinischen Bildes, des Sitzes der Geschwülste und des makroskopischen und histologischen Befundes möchte ich für die zwei von mir beschriebenen Tumoren zu folgendem Resultat kommen.

Bei dem ersten Fall handelt es sich mit Sicherheit um einen dem normalen Organ vollkommen homologen Tumor des Glomus caroticum.

Im zweiten Fall dagegen finden wir eine vom histologischen Aufbau des normalen Organs abweichende Anordnung der Zellen; jedoch entsprechen die beiden vorhandenen Zellformen in allem den typischen Zellen des normalen Organs und den Zellformen, die wir in vielen anderen Tumoren des Glomus caroticum beschrieben finden. Berücksichtigt man außerdem die Klinik, den durch seine engen topographischen Beziehungen zur Carotisgabelung auffallenden Sitz dieser Geschwulst, den alveolären Bau, seinen Gefäßreichtum und seine gute Abkapselung, so muß auch in diesem Falle die Diagnose auf einen Tumor des Glomus caroticum gestellt werden.

Zum Schluß sei es mir gestattet, auch an dieser Stelle meinem hochverehrten Chef, Herrn Professor Dr. C e e l e n für die Überlassung des Materials und vielfachen Ratschläge meinen allerbesten Dank auszusprechen.

Literatur.

1. Arnold: Über die Struktur des Ganglion intercaroticum. Virch. Arch. Bd. 33. 1865.
2. Aschoff: Lehrbuch der pathol. Anat. 7. Aufl. 1928.
3. Betke: Bruns Beiträge. Bd. 95. 1915.
4. Bevan et Mc Carthy: Surg. etc. Bd. 49. 1919 (Ref. bei White).
5. de Castro: Trav. Lab. Recherch. Biol. Madrid. Bd. 24. 1926.
6. de Castro: Trav. Lab. Recherch. Biol. Madrid. Bd. 25. 1927/28.
Beide referiert bei White.
7. Cragg: Arch. of Path. Bd. 18. 1934. (Ref. bei White.)
8. Dietrich und Siegmund: Die Nebenniere und das chromaffine System; in Henke-Lubarsch. Handbuch der spez. path. Anat. u. Hist. Bd. 8. 1926.
9. Fischer: Ztschr. f. exper. Med. Bd. 39. 1924.
10. Gronemann: Zur Kasuistik der Geschwülste des Nodus caroticus. Virch. Arch. Bd. 218. 1914.
11. v. Heinleth: Ein Fall von Carotisdrüsenperitheliom. Münch. med. Woch. 1900. Nr. 26.
12. Hering: Der Carotisdruckversuch. Münch. med. Woch. 1923. Nr. 42.
13. Hering: Der Sinus caroticus an der Ursprungsstelle der Carotis interna als Ausgangspunkt eines hemmenden Herzreflexes und eines depressorischen Gefäßreflexes. Münch. med. Woch. 1924.
14. Kaufmann: Lehrbuch der path. Anat. 7. u. 8. Aufl. 1922.
15. Kohn: Bau und Entwicklung der sogenannten Carotisdrüse, Arch. f. mikr. Anat. u. Entw. Bd. 56. 1900.
16. Kohn: Die Paraganglien. Arch. f. mikr. Anat. u. Entw. Bd. 62. 1903.
17. Luschka: Über die drüsenartige Natur des sogenannten Ganglion intercaroticum. Arch. f. Anat. u. Physiol. Jahrg. 1862.
18. Marchand: Beiträge zur Kenntnis der normalen und pathologischen Anatomie des Glandula carotica und der Nebennieren. Intern. Beitr. zur wissenschaftlichen Med. 1891.
19. Massaglia: Über die Funktion der sogenannten Carotisdrüse. Frankfurter Ztschr. f. Pathologie. Bd. 18. 1916.
20. Mönckeberg: Die Tumoren der Glandula carotica. Zieglers Beitr. Bd. 38. 1905.
21. Oberndorfer: Zur Frage der sogenannten Carotisdrüsentumoren. Ztrbl. für allg. Path. und pathol. Anat. Bd. 16. 1905.
22. Paltauf: Über die Geschwülste der Glandula carotica nebst einem Beiträge zur Histologie und Entwicklungsgeichte derselben. Zieglers Beitr. Bd. 11. 1892.

23. P a u n z : Pathologisch-anatomische Veränderungen der Carotisdrüse. Virch. Arch. Bd. 241. 1923.
 24. Rankin and Welbeck: Ann. Surg. Bd. 93. 1931 (Ref. bei White).
 25. Ribbert: Geschwulstlehre. Bonn 1904.
 26. Urban: Über den Karotissinusreflex beim Menschen. D.M.W. 1935. Nr. 40.
 27. White: Die Struktur des Glomus caroticum, seine Pathologie und Physiologie und seine Beziehung zum Nervensystem. Ziegler, Beitr. Bd. 96. 1935.
 28. Drüner, Über die anatomischen Unterlagen der Sinusreflexe Herings. D.M.W. 1925. Nr. 14.
-

Lebenslauf.

Ich, Wilhelm M a h n e , wurde am 7. Dezember 1910 in Neuß geboren. Vom 6. bis 9. Lebensjahre besuchte ich die städtische Vorschule in meiner Heimatstadt und kam anschließend auf das staatliche Gymnasium in Neuß, wo ich Ostern 1929 das Zeugnis der Reife erhielt. Vom S.S. 1929 ab studierte ich an der Universität in Freiburg i. Br. Medizin, wo ich im Herbst 1931 die ärztliche Vorprüfung ablegte. Die klinischen Semester verbrachte ich in Düsseldorf 1, Bonn 1 und Tübingen 4 und bestand am 22. Dezember 1934 das ärztliche Staatsexamen ebenfalls in Tübingen.

Mein praktisches Jahr verbrachte ich auf der Inneren Abteilung der Städtischen Krankenanstalten in Krefeld und am Pathologischen Institut der Universität Bonn und erhielt am 25. 1. 36 die Bestallung als Arzt.
